

## **EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE PERIDURAL DURANTE EL PARTO.**

Cano S; Pereda A; Álvarez V; Girvent M; Reus A; Ojeda F. Servicio de Ginecología i Obstetricia. Hospital General de Granollers (Barcelona).

### **OBJETIVOS.**

Analizar la demanda de analgesia peridural de las pacientes durante el trabajo de parto y la influencia de ésta sobre la vía final del parto.

### **PACIENTES Y MÉTODOS.**

Se realiza un estudio prospectivo con reclutamiento consecutivo de 100 pacientes asistidas en el Hospital General de Granollers (Barcelona), analizando los siguientes parámetros: demanda de peridural, características del dolor durante la contracción (valores de 1 al 4), paridad, administración de Oxitocina, vía final del parto.

Se incluyeron gestantes con feto único, sin patología asociada, ni signos de sospecha de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto.

### **RESULTADOS.**

De 100 mujeres asistidas, 96 pidieron anestesia peridural, de las cuales sólo se pudo practicar la técnica en 87 mujeres; 9 no la recibieron por falta de tiempo. La Media de la evaluación subjetiva de éxito de la anestesia fue 8'25 (valores entre 0-10). Cuatro pacientes no solicitaron anestesia, lo motivos fueron: 3 desconocían la existencia de la analgesia (se trataba de pacientes inmigrantes) y 1 quería un parto sin anestesia. En la tabla 1 revisamos los datos de estudio en referencia al total de mujeres que recibieron o no anestesia peridural.

TABLA 1. Principales parámetros estudiados.

PARÁMETROS		CON PERIDURAL (n=87)	SIN PERIDURAL (n=13)
EDAD	MEDIA	29'8 años	30'6 años
	RANGO	18-40	21-39
	MEDIANA	30	30
CARACTERÍSTICAS DOLOR CONTRACCIÓN	1	16 (18'4%)	0
	2	16 (18'4%)	4 (30'8%)
	3	33 (37'9%)	8 (61'5%)
	4	22 (25'9%)	1 (7'7%)
PARIDAD	NULÍPARA	52 (59'8%)	3 (23%)
	PRIMÍPARA	28 (32'2%)	6 (46'15%)
	MULTÍPARA	7 (8%)	4 (30'8%)
ADMINISTRACIÓN OXCITOCINA	NO	19 (21'8%)	12 (92'3%)
	INDUCCIÓN	29 (33'33%)	0
	ESTIMULACIÓN	39 (44'8%)	1 (7'7%)
VÍA PARTO	EUTÓCICO	45 (51'7%)	13 (100%)
	ESPÁTULAS	15 (17'2%)	0
	FÓRCEPS	13 (14'9%)	0
	CESÁREA	14 (16'1%)	0

TABLA 2. Peridural según dilatación.




TABLA 3 . Tiempo total de trabajo de parto.

PARIDAD	CON ANALGESIA	SIN ANALGESIA
Nulípara	8:27	3:30
Primípara	6:12	2:51
Múltipara	4:24	2:56

TABLA 4. Según el nivel de estudios.

NIVEL ESTUDIOS	CON ANALGESIA	SIN ANALGESIA
PRIMARIOS	56 (64'4%)	9 (69'2%)
SECUNDARIOS	20 (23%)	2 (15'4%)
UNIVERSITARIOS	10 (11'5%)	2 (15'4%)

### CONCLUSIONES.

La mayoría de las mujeres solicitan la administración de peridural. De las mujeres que no pidieron anestesia, la mayor parte fue por desconocimiento de la técnica.

En los partos de las mujeres sin peridural fueron partos eutócicos y casi todas no precisaron la administración de oxitócicos por trabajo de parto avanzado.