

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SEXUAL TRAS CIRURGIA CORRECTORA DEL PROLAPSO CON MALLAS.

**Girvent M., Pereda A., Cortés S., Lineros E., Ojeda F.
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Fundació Hospital Asil de Granollers.**

Objetivo

El objetivo es determinar si las pacientes portadoras de mallas para la corrección del prolapso genital – anterior i/o posterior- han visto afectada su función sexual debido a la intervención.

Pacientes y método

Se seleccionaron las pacientes intervenidas con Prolift® entre enero 2007 y diciembre 2009 en el Hospital General de Granollers.

Se realizó entrevista telefónica interrogando sobre la función sexual antes y después de la inserción de malla mediante el cuestionario PISQ-12.

De las 64 pacientes que cumplían criterios de inclusión:

5 no fueron localizadas.
31 no tenían relaciones sexuales.
28 contestaron al PISQ-12.

De estas:

20 corrección compart. anterior
5 del posterior
3 de ambos.

Edad media 55 años (rango = 34-67 D.E.=8.21)

El cuestionario se presenta en la imagen de la página siguiente:

Cuestionario PISQ-12**Cuestionario sobre función sexual y Prolapso Vaginal/Incontinencia de orina (PISQ-12)**

Instrucciones: A continuación encontrará una lista de preguntas acerca de su vida sexual y la de su compañero. Toda la información es estrictamente confidencial. Sus respuestas confidenciales se utilizarán únicamente para ayudar a los médicos a comprender qué aspectos son importantes para los pacientes en su vida sexual. Por favor, ponga una cruz en la casilla que, desde su punto de vista, responda mejor a la pregunta. Conteste a las preguntas considerando su vida sexual durante los últimos 6 meses. Gracias por su ayuda.


1. **¿Con qué frecuencia siente deseo sexual? Este deseo puede incluir deseo de realizar el acto sexual, planear realizarlo, sentirse frustrada debido a la falta de relaciones sexuales, etc.**
 Todos los días 1 vez a la semana 1 vez al mes menos de 1 al mes Nunca
2. **¿Llega al clímax (llega al orgasmo) cuando tiene relaciones sexuales con su compañero?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
3. **¿Siente excitación sexual (se excita) cuando tiene actividad sexual con su compañero?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
4. **¿Está satisfecha con las diferentes actividades sexuales de su actual vida sexual?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
5. **¿Siente dolor durante las relaciones sexuales?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
6. **¿Sufre incontinencia de orina (fugas de orina) durante la actividad sexual?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
7. **El miedo a la incontinencia (heces u orina), ¿restringe su actividad sexual?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
8. **¿Evita las relaciones sexuales debido a los bultos en la vagina (vejiga, recto o vagina caídos)?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
9. **Cuando tiene relaciones sexuales con su compañero, ¿siente reacciones emocionales negativas como miedo, repugnancia, vergüenza o culpabilidad?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
10. **¿Tiene su compañero algún problema en la erección que afecte su actividad sexual?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
11. **¿Tiene su compañero algún problema de eyaculación precoz que afecte su actividad sexual?**
 Siempre Frecuentemente Algunas veces Rara vez Nunca
12. **En comparación con los orgasmos que ha tenido en el pasado, ¿Cómo calificaría los orgasmos que ha tenido en los últimos seis meses?**
 Mucho menos intensos Menos intensos Igual de intensos Más intensos Mucho más intensos

Resultados


La media del cuestionario es de 37.50 antes de la intervención y 34.71 posteriormente. Comparando las medias con una T de Student vemos que NO son significativamente distintas (p de 0,06).

PISQ-12	Medias		Desv. estandard	
	Pre-op	Post-op	Pre-op	Post-op
1. Deseo	2,29	2,11	1,12	1,26
2. Clímax	3,04	2,68	1,00	1,19
3. Excitación	2,93	2,71	1,12	1,33
4. Satisfacción	3,25	2,93	1,11	1,36
5. Dolor	3,46	2,93	1,07	1,46
6. Incontinencia en coito	3,64	3,32	1,06	1,31
7. Miedo incontinencia	3,79	3,64	0,69	0,99
8. Evitar por bulto	3,57	3,07	1,03	1,21
9. Emociones negativas	3,79	3,54	0,83	1,20
10.Probl. erección	3,32	3,57	1,25	1,10
11.Probl. eyaculación precoz	3,57	3,50	1,14	1,20
12.Intensidad del orgasmo	2,18	1,82	0,98	0,98
TOTAL	37,50	34,71	5,86	6,01

PISQ post op



DISPAREUNIA



Conclusión

En nuestro estudio, las pacientes no empeoran su función sexual tras la corrección del prolapso mediante malla. Dado que la p es muy próxima a la significación estadística, cabe pensar que una N mayor podría generar resultados distintos.

Es necesario un estudio prospectivo y con una N mayor para determinar la función sexual de las pacientes que acudan a nuestra consulta mediante el PISQ antes y después de la cirugía, así como comparar los resultados entre cirugía clásica y cirugía con mallas.